



CLASE	INTERACCIONES DROGA-DROGA	INGREDIENTE ACTIVO	NIVEL FORMULARIO	COSTO PROMEDIO POR RECETA	COMENTARIO ADICIONAL
SSRI	Antagonistas de 5-HT (ej. sumatriptan), St. John's Wort, opioides, MAOI, antiarrítmicos, anticoagulantes	Citalopram Celexa	1	"\$ 297.22 (\$ 297.22)"	Menos interacciones, causa prolongación del intervalo QT (monitoreo y DDI). Pacientes > 60 años: Dosis máxima de 20 mg/d DDI: omeprazole, cimetidine
		Escitalopram Lexapro	2	"\$ 6.39 (\$ 359.81)"	Metabolito de citalopram. Posible prolongación del intervalo QT. Conversión: Lexapro 5mg = Celexa 10 mg
		Fluoxetine Prozac	"1 (cap) 2 (tab)"	"\$ 6.66 (\$ 643.74)"	Metabolito de larga duración ("wash-out" de 5 semanas para comenzar un MAOI) Causa anorexia. DDI: Warfarina (Inhibe CYP2C19)
		Fluvoxamine Luvox	2	\$ 70.47	DDI: Propranolol, teofilina, tizanidin
		"Paroxetine Paxil"	2	"\$ 124.34 ER \$ 12.62 (\$ 260.16)"	SSRI de más corta duración. HRM: Tiene efectos anticolinérgicos (evitar en Alzheimer y uso concomitante de antimuscarínico).
		Sertraline Zoloft	1	"\$ 5.31 (\$ 409.74)"	Causa problemas GI (diarrea). Sistema Nervioso Central: insomnia, mareo, fatiga, somnolencia.
		Vilazodone Viibryd	4, QL, ST	(\$ 284.24)	Causa D/N/V, insomnio, disminución de libido, síndrome serotoninérgico.
		Vortioxetine Trintellix	4, QL, ST	(\$ 428.75)	Causa D/N/V, boca seca, estreñimiento, mareo, disfunción sexual.
SNRI	Antihipertensivo, anticoagulantes, antiarrítmicos, antagonistas de 5-HT (ej. sumatriptan)	Venlafaxine Effexor	2	\$ 11.72 (\$ 590.85)	Menor efecto anticolinérgico. Causa sedación. Aumenta presión sanguínea a dosis alta. DDI: Indinavir
		Desvenlafaxine Khedezla, Pristiq	2	\$ 56.89 (\$ 428.28)	Metabolito activo de venlafaxine (menor efecto de presión alta). Causa hiperlipidemia.
		Duloxetine Cymbalta	2	\$ 12.04 (\$ 299.29)	Causa hipertensión ortostática, efectos anticolinérgicos y hepatotoxicidad.
		Levomilnacipran Fetzima	3, QL, ST	-	Causa hipotensión ortostática, náusea.

# LISTADO DE ANTIDEPRESIVOS EN FORMULARIO



CLASE	INTERACCIONES DROGA-DROGA	INGREDIENTE ACTIVO	NIVEL FORMULARIO	COSTO PROMEDIO POR RECETA	COMENTARIO ADICIONAL
TCA (3o)	Baclofen, quinolonas, macrólidos, inhibidores de acetilcolinesterasa, disulfiram, haloperidol, MAOI, opioides, antiarrítmicos, laxantes antihipertensivos, anticoagulantes, hipnóticos	Imipramine Tofranil	2, PA ns	\$ 31.45	Arritmias cardíacas, agitación, desorientación, alopecia, Anorexia, retención urinaria, constipación
		Trimipramine Surmontil	2, PA ns	-	Arritmias cardíacas, ansiedad, urticaria, retención urinaria
Amoxapine		2	-	Sedación, constipación, xerostomía	
Desipramine Norpramin		2, PA ns	\$ 61.84	Metabolito de amitriptyline. Menos sedación y efecto anticolinérgico.	
Nortriptyline Pamelor		2, PA ns	\$ 7.68	Metabolito de aMetabolito de amitriptyline. Menos efecto anticolinérgico y ortostático (mayor para viejos). Menos sedación y efecto anticolinérgico.	
Protriptyline Vivactil		2, PA ns	-	Arritmias cardíacas	
MAOI	Nitratos, inhibidores de acetilcolinesterasa, entacapoone, tolcapone, SSRI, TCA, SNRI, levodopa, opioides, ansiolíticos	Phenelzine Nardil	2	-	Edema, hipotensión, somnolencia, GI disturbancias
		Tranlycypromine Parnate	2	-	Edema, hipotensión, ansiedad, insomnio, urticaria
		Isocarboxazid Marplan	4	-	Mareo, resequedad de la boca y nausea
		Selegiline (MAO-B) Emsam	2 5, QL, Patch	\$ 115.42 (\$ 1,804.90)	Forma de dosificación oral es para Parkinson. Causa sedación.
OTROS		Trazodone Desyrel	1	\$ 7.63	DDI: Digoxin, antiarrítmicos, hipnóticos, beta bloqueadores. Causa hipertensión, somnolencia, priapismo.
		Nefazodone	2	\$ 22.83	Dolor de cabeza, somnolencia, mareo, xerostomía, hepatotoxicidad.
		Mirtazapine Remeron	2	\$ 9.39	DDI: Beta bloqueadores, hipnóticos, anticoagulantes. Causa aumento en peso.
		Bupropion Wellbutrin	2	\$ 15.97 (\$ 2,013.53)	Puede causar ataque epiléptico. C/I: Pacientes con desórdenes alimenticios (anorexia/bulimia)

Esta lista no cubre el total de los efectos adversos ni interacciones posibles. • Consulte los "package insert" (información del medicamento) para más información.  
Todos los medicamentos antidepresivos tienen BBW de suicidio para niños, adolescentes y jóvenes adultos